


27

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्रिस्लिक अम्ल



टिप्पणियाँ

पिछले पाठों में आपने ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा जिसमें उपस्थित अभिलक्षकीय समूहों में कार्बन-ऑक्सीजन एकल आबंध उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के ऐसे अन्य वर्ग भी हैं जिनमें अभिलक्षकीय समूहों में कार्बन-ऑक्सीजन द्वि-आबंध उपस्थित होता है। यौगिकों के इन वर्गों में कार्बोनिल यौगिकों जैसे ऐल्डहाइड और कीटोन तथा कार्बोक्रिस्लिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न आते हैं। ये कार्बनिक यौगिक उद्योगों में तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण-दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन का महत्वपूर्ण अंग है। आइए, अब इन यौगिकों के रसायन के बारे में विस्तार से पढ़ें।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के पश्चात्, आप:

- ऐल्डहाइडों तथा कीटोनों के आई.यू.पी.ए.सी. नाम दे सकेंगे,
- ऐल्डहाइडों तथा कीटोनों को बनाने में सामान्य विधियों का वर्णन कर सकेंगे,
- कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐल्डहाइडों और कीटोनों के भौतिक गुणधर्म के परिवर्तनों की चर्चा कर सकेंगे,
- ऐल्डहाइडों और कीटोनों द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की व्याख्या कर सकेंगे,
- कुछ अभिक्रियाओं और उन पर आधारित परीक्षणों के आधार पर ऐल्डहाइडों और कीटोनों में अंतर कर सकेंगे,
- कार्बोक्रिस्लिक अम्लों के आई.यू.पी.ए.सी. नाम दे सकेंगे,
- कार्बोक्रिस्लिक अम्लों के विरचन की सामान्य विधियों की व्याख्या कर सकेंगे,
- सरल मोनोकार्बोक्रिस्लिक अम्लों द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे,




- कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे,
- कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों के विरचन और उनकी कुछ अंतरापरिवर्तन अभिक्रियाओं की व्याख्या कर सकेंगे,
- ऐल्डहाइडों, कीटोनों और कार्बोक्सिलिक अम्लों के महत्व को बता सकेंगे।


27.1 ऐल्डहाइड और कीटोन

पिछले पाठों से आप इन वर्गों के यौगिकों से कुछ परिचित हैं। इन यौगिकों को कार्बोनिक यौगिक भी कहा जाता है और उनमें C=O समूह उपस्थित होता है। ये यौगिक प्रकृति में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं और कई भोज्य पदार्थों में सुगंध और महक के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये उद्योगों में भी संश्लेषण में अभिकर्मकों और विलायकों के रूप में महत्वपूर्ण हैं।

ऐल्डहाइडों में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु आबंधित होता है और दूसरा समूह या तो एक हाइड्रोजन परमाणु या कोई ऐल्किन (या ऐरिल) समूह हो सकता है। कीटोनों में, कार्बोनिल समूह दो ऐल्किल या ऐरिल समूहों से आबंधित होता है। कीटोनों में उपस्थित दोनों समूह एकसमान भी हो सकते हैं और भिन्न भी, जिसके फलस्वरूप क्रमशः: सममित या असममित कीटोन प्राप्त होते हैं।



आप पैनिलियन और कपूर से तो परिचित होंगे। उनकी संरचनाएं नीचे दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि उनमें क्रमशः: ऐल्डहाइड और कीटोन समूह उपस्थित हैं।






टिप्पणियाँ

27.1.1 ऐल्डहाइडों और कीटोनों की नामपद्धति

नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में, ऐलिफैटिक ऐल्डहाइडों को ऐल्केनैल (alkanal) कहा जाता है। संगत ऐल्केन के नाम के अंतिम -e को -al द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।

ऐल्डहाइडों के कुछ सामान्य उदाहरण और उनके नाम नीचे दिए गए हैं।





ध्यान दीजिए कि जब -CHO समूह किसी वलय से आबंधित होता है तब यौगिक को कार्बोल्डहाइड कहा जाता है।

यदि रखिए कि ऐल्डहाइडों में कार्बोनिल कार्बन शृंखला के अंत पर उपस्थित होता है और उसे 1- स्थिति (संख्या-1) प्रदान की जाती है। अतः ऐल्डहाइड के नाम में इस स्थिति को व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता है। इसे नीचे दिए उदाहरणों में दर्शाया गया है।




नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार कीटोनों को ऐल्केनोन कहा जाता है। उनके नामों को प्राप्त करने के लिए ऐल्केन के अंत का -e (अंग्रेजी नाम में) one (ओन) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कार्बन शृंखला का संख्यांकन इस प्रकार किया जाता है ताकि कार्बोनिल समूह को न्यूनतम संख्या प्राप्त हो। कीटोनों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।





1-फेनिलएथेनोन
(एसीटोफीनोन)



(बेन्जोफीनोन)

27.1.2 ऐल्डहाइडों और कीटोनों का विरचन

ऐल्डहाइडों और कीटोनों के विरचन की अधिकांश विधियों को आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। आइए, उनको एक बार दोहरा ले।

1. प्राथमिक और द्वितीय ऐल्कोहॉलों का उपचयन


पिछले पाठों में आपने पढ़ा कि प्राथमिक ऐल्कोहॉलों को ऐल्डहाइडों में तथा द्वितीयक ऐल्कोहॉलों को कीटोनों में उपस्थित किया जा सकता है।

2. ऐल्कीनों का ओजोन-अपघटन (Ozonolysis)

इस अभिक्रिया की चर्चा पाठ 26 में की गई है। आरंभिक ऐल्कीन की संरचना के अनुसार ऐल्डहाइड या कीटोन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं।

3. ऐल्काइनों का जलयोजन (Hydration)


ऐल्काइनों के जलयोजन से ऐल्डहाइडों या कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं। मार्कोफनीकॉफ नियम के अनुरूप जलयोजन से कीटोन प्राप्त होते हैं जबकि प्रति-मार्कोफनीकॉफ नियम के अनुरूप जलयोजन से ऐल्डहाइडों प्राप्त होते हैं।



पाठ 24 में इन अभिक्रियाओं की विस्तृत चर्चा को आप फिर से पढ़ सकते हैं।

4. फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐसिलीकरण (Friedal-Crafts Acylation)


ऐरोमैटिक कीटोनों को फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐसिलीकरण (ऐल्केनॉयलीकरण) अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। इस अभिक्रिया का एक उदाहरण नीचे दिया गया है।



इसी प्रकार की ऐसिलीकरण अभिक्रिया की चर्चा जिसमें एथेनॉयल क्लोराइड का उपयोग किया गया है, पाठ 24 में ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बनों की इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत भी की गई थी।

27.1.3 संरचना और भौतिक गुणधर्म


ऐल्डहाइडों और कीटोनों दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं का sp^2 संकरण होता है। अतः कार्बन और ऑक्सीजन से आबंधित समूह एक तल में उपस्थित होते हैं। इसे चित्र 27.1 में दिखाया गया है।



चित्र 27.2: कार्बोनिल अभिलक्षकीय समूह की संरचना

आप चित्र में देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के p -कक्षकों (p -orbitals) के अतिव्यापन से π -आबंध बनता है। p -कक्षक अणु के तल के लंबवत् तल में उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के दो एकाकी युग्मों पर भी ध्यान दीजिए।

आप यह भी जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणात्मक (electronegative) होता है। अतः यह कार्बन-ऑक्सीजन द्वि-आबंध ($\text{C}=\text{O}$ bond) के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसके फलस्वरूप अणु में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है।






अतः ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश (δ^-) और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनात्मक आवेश (δ^+) उत्पन्न हो जाता है। कार्बोनिल समूह की इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण ऑक्सीजन परमाणु नाभिकस्नेही (nucleophilic) और क्षारीय हो जाता है जबकि कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉनस्नेही (electrophilic) की तरह व्यवहार करता है। ऐल्डहाइडों और कीटोनों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाएँ भी इसी ध्रुवणता के कारण हैं। ऐल्डहाइडों और कीटोनों के अणुओं के बीच द्वि-ध्रुव-द्वि-ध्रुव आकर्षण के कारण उनके क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में उच्चतर होते हैं। कुछ ऐल्डहाइडों और कीटोनों के भौतिक गुणधर्म सारणी 27.1 में दिए गए हैं।

सारणी 27.1 कुछ ऐल्डहाइडों और कीटोनों के भौतिक गुणधर्म

यौगिक	mp. (K)	b.p. (K)	जल में विलेयता (%)
मेथैनैल	181	252	55
एथैनैल	150	294	∞
प्रोपैनैल	192	322	20
ब्यूटेनैल	166	348	7.1
बेन्जेल्डहाइड	217	452	0.3
प्रोपेन-2-ओन	178	329	∞
ब्यूटेन-2-ओन	187	353	25.6
पेन्टेन-2-ओन	195	375	5.5
पेन्टेन-3-ओन	232	374	4.8
ऐसीटोफीनोन	294	475	15
बेन्जोफीनोन	321	578	-


सारणी 27.1 से आप देख सकते हैं कि इन यौगिकों की जल में अच्छी विलेयता है। ऐसा ऐल्डहाइड (अथवा कीटोन) के ऑक्सीजन परमाणु और जल के अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच संभव हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है, जिसे चित्र 27.2 में दिखाया गया है।



चित्र. 27.2: कार्बोनिल यौगिक और जल के अणु के बीच हाइड्रोजन आबंधन

27.1.4 ऐल्डहाइडों और कीटोनों की अभिक्रियाएँ

यदि आप कार्बोनिल यौगिक के अणु की संरचना को ध्यानपूर्वक देखें तो आप पाएंगे कि इसमें अभिक्रियाशीलता के तीन केंद्र हैं जिन्हें नीचे दिखाया गया है।



चूंकि ऑक्सीजन परमाणु नाभिकस्नेही प्रकृति का है, अतः इस पर इलेक्ट्रॉनस्नेही आक्रमण कर सकता है जबकि कार्बोनिल कार्बन प्रकृति में इलेक्ट्रॉनस्नेही है और इस पर नाभिकस्नेही आक्रमण कर सकते हैं। अभिक्रिया की तीसरी स्थिति α -कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु है। यह प्रकृति में अम्लीय होता है और विशिष्ट अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करता है जिन्हें आप इस भाग में पढ़ेंगे।

यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि ऐल्डहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ऐसा निम्नलिखित दो कारणों के फलस्वरूप होता है।

- (i) ऐल्डहाइडों में केवल एक ऐल्किल समूह उपस्थित होता है जबकि कीटोनों में दो। चूंकि ऐल्किल समूह प्रकृति में इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, अतः कीटोनों में दो ऐल्किल समूहों से आबर्धित कार्बन ऐल्डहाइड कार्बोनिल कार्बन की तुलना में कम धनात्मक (इलेक्ट्रॉनस्नेही) होता है। अतः यह नाभिकस्नेहियों द्वारा आक्रमण के प्रति कम सुग्राही होता है।
- (ii) कीटोनों में दो ऐल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन को ऐल्डहाइडों में कार्बोनिल कार्बन की तुलना में अधिक घिरा हुआ बना देते हैं। इस कारण भी ऐल्डहाइडों में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिकस्नेहियों का आक्रमण कीटोनों में कार्बोनिल कार्बन की तुलना में अधिक आसानीपूर्वक होता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब ऐल्डहाइडों और कीटोनों की अभिक्रिया के बारे में पढ़ें।

A नाभिक स्नेही संकलन की क्रियाविधि

सामान्य अवस्थाओं में नाभिक स्नेही कार्बोनाइल परमाणु पर आक्रमण करता है और एक चतुष्फलकीय मध्यक देता है इसके साथ ही विलायक से प्रोटोनीकरण (H_2O या ऐल्कोहॉल) होता है। यह नीचे दर्शाया गया है।


मॉड्यूल - 7

कार्बनिक यौगिकों का रसायन




टिप्पणियाँ


ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल



लेकिन अम्लीय संकलन में प्रथम चरण में कार्बोनाइल की ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण होता है।




द्वितीय चरण में नाभिक स्नेही कार्बोनाइल कार्बन पर आक्रमण करता है और संकलन प्रक्रम है।



1. सायनोहाइड्रिनों का बनना

कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन सायनोहाइड्रिन के साथ अभिक्रिया द्वारा सायनोहाइड्रिन बनाते हैं।



ध्यान दीजिए कि सायनोहाइड्रिन में आरंभिक कार्बोनिल यौगिक की तुलना में एक कार्बन परमाणु अधिक है। सायनोहाइड्रिन कार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण में उपयोगी हैं जिनके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

2. हेमीएसीटैलों (Hemiacetals) का बनना



ऐल्डहाइड और कीटोन ऐल्कोहॉलों के साथ अभिक्रिया द्वारा हेमीएसीटैल बनाते हैं। हेमी का अर्थ ग्रीक भाषा में ‘आधा’ होता है। हेमीएसीटैल के अणुओं में एक ही कार्बन

कार्बनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ

परमाणु के साथ एक –OH और एक –OR समूह आवधित होते हैं। ऐल्कोहॉल का दूसरा अणु अभिक्रिया करके ऐसीटैल अथवा कीटॉल बनाता है। ऐल्डहाइड से ऐसीटैल और कीटोन से कीटैल बनता है।





ध्यान दीजिए कि ऐसीटैल में एक ही कार्बन परमाणु के साथ दो—OR समूह उपस्थित होते हैं।

ऐसीटैल क्षारीय माध्यम में स्थायी होते हैं और इसीलिए उनका उपयोग ऐल्डहाइडों और कीटोनों के राक समूह (protecting group) के रूप में किया जाता है। ऐसीटैलों को पुनः कार्बोनिल यौगिकों में तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है जो कि ऊपर दी गई अभिक्रिया की उत्क्रमणीय प्रकृति (reversible nature) के कारण होता है।

3. ऐल्कोहॉलों का बनना

ग्रीन्यार अभिक्रमक (Grignard reagents RM_gX) ऐल्डहाइडों और कीटोनों के साथ अभिक्रिया द्वारा ऐल्कोहॉल बनाते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है।




माँड्यूल - 7

कार्बनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बो्विस्मिलिक अम्ल





आप पाठ 26 में इन अभिक्रियाओं को ऐल्कोहॉलों के विरचन के अंतर्गत पहले पढ़ चुके हैं।



B. संकलन-विलोपन (Addition-Elimination) या संघनन (Condensation) अभिक्रियाएँ

1. अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया


ऐल्डहाइड और कीटोन अमोनिया और प्राथमिक ऐमीनों के साथ अभिक्रिया द्वारा इमीन (imines) बनाते हैं। इमीन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन नाइट्रोजन द्वि-आबंध होता है।



ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में प्राथमिक ऐमीन और कार्बोनिल यौगिक से जल के अणु की हानि होती है। अमोनिया के अन्य व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रियाएँ नीचे दी गई हैं:



कार्बनिक यौगिकों का रसायन




ऊपर बने यौगिक अपेक्षाकृत अविलेय ठोस होते हैं और उनके अभिलाक्षणिक गलनांक होते हैं। अज्ञात ऐलिडहाइडों और कीटोनों के लिए इन यौगिकों को बनाया जा सकता है और उनके गलनांकों का निर्धारण किया जा सकता है। इन गलनांकों को ज्ञात ऐलिडहाइडों और कीटोनों के इन व्युत्पन्नों के गलनांकों के साथ मिलाया जाता है जो कि पहले से मानक सारणियों में सूचीबद्ध होते हैं और इस प्रकार कार्बोनिल यौगिक की पहचान कर ली जाती है।

C. विअॉक्सीजनीकरण अभिक्रियाएँ (De-oxygenation Reactions)

विआॅक्सीजनीकरण अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें आॅक्सीजन की हानि होती है। ऐल्डहाइडों और कीटोनों को निम्नलिखित दो अभिक्रियाओं द्वारा संगत ऐल्केनों में अपचयित किया जा सकता है।


1. वुल्फ-किशनर अपचयन (Wolff-Kishner Reduction)

जब किसी ऐलिडहाइड या कीटोन को उच्च क्वथनांक वाले ऐल्कोहॉल में हाइड्रैजीन के क्षारीय विलयन में गर्म किया जाता है तब कार्बोनिल समूह मेथिलीन ($>\text{CH}_2$) समूह में परिवर्तित हो जाता है।




2. क्लीमेन्सन अपचयन (Clemmensen Reduction)

इस अभिक्रिया को अमलगमित जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग द्वारा अम्लीय माध्यम में किया जाता है।




D. ऐल्डहाइडों का उपचयन

कीटोनों के विपरीत ऐल्डहाइडों को अनेक उपचायकों के उपयोग द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपचायित किया जा सकता है। ये अभिकर्मक क्रोमिक अम्ल, क्रोमियत ट्राइऑक्साइड, परमैंगनेट या सिल्वर ऑक्साइड हो सकते हैं। आपने इन अभिकर्मकों में से कुछ के साथ उपचयन के बारे में पहले पढ़ा है। सिल्वर आयन वरणात्मक रूप से —CHO समूह का उपचयन करते हैं। यह टॉलेन परीक्षण (Tollen's test) का भी आधार है। इस परीक्षण में जलीय सोडियम नाइट्रोट और जलीय अमोनिया के मिश्रण को जिसे टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है, कार्बोनिल यौगिक में मिलाया जाता है। टॉलेन अभिकर्मक में $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ संकुल आयन (complex ion) होता है। यदि ऐल्डहाइड उपस्थित हो तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपचायित हो जाता है जबकि Ag^+ आयन अपचित होकर सिल्वर धातु बनाते हैं जो परखनली की दीवारों पर चिपक जाता है और दर्पण जैसा चमकदार प्रतीत होता है।




ऐल्डहाइड फेलिंग विलयन (Fehling solution), द्वारा उपपचित हो जाते हैं जिनमें उपचायक के रूप में Cu^{2+} (क्यूप्रिक आयन) टार्टेट आयनों के साथ संकुलित होते हैं। ये Cu^{2+} क्षारीय माध्यम में ऐल्डहाइडों द्वारा अपचित होकर क्यूप्रस ऑक्साइड का भूरा-लाल अवक्षेप बनाते हैं।




E. α -कार्बन पर अभिक्रियाएँ

ऐल्डहाइडों और कीटोनों में α -हाइड्रोजन काफी अम्लीय होता है ओर प्रबल क्षारक द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है।




इस प्रकार प्राप्त ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो सकता है जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। इसे ईनॉलेट (*enolate*) आयन कहते हैं। प्रोटॉनिकरण पर यह ईनॉल देता है।




अतः कीटों रूप और ईनॉल रूप सम्य (equilibrium) में होते हैं। इसे कीटो-ईनॉल चलावयवता (keto-enol tautomerism) भी कहा जाता है। α -हाइड्रोजन के कारण संभव अभिक्रियाएँ इस प्रकार हैं।

1. हैलोजनीकरण (Halogenation)


α - हाइड्रोजन परमाणु वाली कीटोन आसानी से हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करती है और α - हैलोकीटोन्स उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया अम्लों और क्षारों दोनों प्रोन्त होती है।




($X_2 = Cl_2, Br_2$ or I_2)



क्षारक की उपस्थिति में, बहुहैलोजनीकरण होता है जिससे ट्राइहैलो उत्पाद प्राप्त होता है।



ट्राइहैलो समूह एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है और ट्राइहैलोकीटोन OH^- के साथ अभिक्रिया करता है जिसमें अंततः एक कार्बोक्सिलेट आयन और हैलोफॉर्म (haloform) प्राप्त होता है।






उत्पाद के नाम के आधार पर इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं।


यदि आयोडीन को हैलोजन के रूप में प्रयोग किया जाए तो हमें आयोडोफॉर्म (CHI_3) उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आयोडोफॉर्म एक पीले रंग का चमकदार ठोस होता है जिसका अभिलाक्षणिक गलनांक होता है। अतः यह अभिक्रिया आयोडोफॉर्म परीक्षण का आधार है। इस प्रकार, मेथिल कीटोन आयोडोफॉर्म बनाती है और सकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देती है। आपने आयोडोफॉर्म के बनने के बारे में पाठ 27 में भी पढ़ा था।

2. ऐल्डॉल संघनन (Aldol Condensation)

α -हाइड्रोजन परमाणु वाले ऐल्डहाइड तनु NaOH के साथ अभिक्रिया द्वारा ऐल्डॉल देते हैं। इस अभिक्रिया को नीचे एथेनैल के उदाहरण द्वारा दिखाया गया है।



ध्यान दीजिए कि उत्पाद में ऐल्डहाइड और ऐल्कोहॉल दोनों ही अभिलक्षकीय समूह उपस्थित हैं और इसीलिए उसे ऐल्डॉल कहा जाता है। इस ऐल्डॉल उत्पाद का गर्म करने पर निर्जलीकरण हो जाता है जिससे कि एक α, β -असंतृप्त ऐल्डहाइड प्राप्त होता है जो कि एक संघनन उत्पाद है।



अभिक्रिया की इस पूरी शृंखला को ऐल्डॉल संघनन कहते हैं।

ऐल्डॉल संघनन कीटोनों के साथ भी संभव है। क्या आप थोड़ी और कठिन समस्या के बारे में सोच सकते हैं? यदि α -हाइड्रोजन परमाणुओं वाले दो भिन्न ऐल्डहाइडों का अभिकारकों के रूप में उपयोग किया जाए तो ऐल्डॉल संघनन पर क्या उत्पाद प्राप्त होंगे?

इस स्थिति में अभिक्रिया को विषमाणु ऐल्डॉल संघनन (crossed-alcohol condensation) कहते हैं। इसे आपके लिए प्रश्न के रूप में छोड़ते हैं। हाँ, हम आपको थोड़ा संकेत अवश्य दे सकते हैं। मान लीजिए दो ऐल्डहाइड अणुओं A और B द्वारा निरूपित किया जा सकता है, तब संघनन समान ऐल्डहाइडों के दो अणुओं के बीच हो सकता है। अतः प्राप्त उत्पाद निम्न प्रकार के हो सकते हैं।

A-A, B-B, A-B and B-A.




टिप्पणियाँ

3 कैनिजारों अभिक्रिया


ऐरोमैटिक या एलीफेटिक ऐल्डहाइड जिनमें α -हाइड्रोजन नहीं होता है जब सांद्र KOH/NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो एक अणु ऐल्कोहॉल और कार्बोकिसलिक अम्ल बनाता है। यह अभिक्रिया को **कैनिजारों अभिक्रिया** कहते हैं।

इस अभिक्रिया में ऐल्डहाइड का एक अणु कार्बोकिसलिक अम्ल लवण (सोडियम या पौटेशियम) से आक्सीकृत हो जाता है और ऐल्डहाइड दूसरा अणु ऐल्कोहॉल अणु में अपचयति हो जाता है।


उदाहरण के लिए



यह अभिक्रिया एक ऐल्डहाइड पर OH के नाभिक स्नेही संकलन द्वारा होकर चतुष्फलकीय मध्यक देती है और हाइड्राइड आयन निकलता है।



यह हॉइड्राइड आयन ऐल्डहाइड के द्वितीय अणु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।



इसलिए हम कह सकते हैं कि असमानुपातन हो गया है और साथ ही आक्सीकरण और अपचयन होकर शुरू के दो ऐल्डहाइड अणुओं से एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अणु ऐल्कोहॉल देता है। यह अभिक्रिया केवल उन ऐल्डहाइडों के लिए सीमित होती है जिनमें CHO समूह से अगले पर हाइड्रोजन नहीं होती है।



पाठगत प्रश्न 27.1


- निम्नलिखित को ऐल्डहाइडों या कीटोनों में वर्गीकृत कीजिए और उनके आईयूपीएसी नाम दीजिए:
 - CH_3CHO
 - $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$
 -
 - $\text{OHCCH}_2\text{CH}_3$
- आप प्रोपाइन से प्रोपेनोन किस प्रकार बनाएंगे?
- नाभिकस्नेही संकलन अभिक्रियाओं के प्रति ऐल्डहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं?
- निम्नलिखित के लिए सामान्य संरचना लिखिए:
 - साइयनोहाइड्रिन
 - ऐसीटैल
 - हेमीऐसीटैल
- आप कार्बोनिल (C=O) समूह को (CH_2) समूह में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे?
- ऐल्डॉल क्या होता है?
- कैनिजारो अभिक्रिया को उचित उदाहरण सहित लिखें।

27.2 कार्बोक्सिलिक अम्ल

आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिल अभिलक्षकीय समूह ($-\text{COOH}$) कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकृति में व्यापक रूप में पाए जाते हैं और वे औद्योगिक रूप से भी महत्वपूर्ण रसायन हैं। ऐसीटिक अम्ल का सिरके के रूप में बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यह जटिल जैव अणुओं में भी संरचनात्मक खंड के रूप में महत्वपूर्ण है। आपने वसा अम्लों (fatty acids) के बारे में भी सुना होगा जो कि वसाओं और तेलों के जल-अपघटन से प्राप्त लंबी शृंखला वाले ऐलिफेटिक अम्ल होते हैं। स्टेरिक अम्ल (stearic acid) एक ऐसा ही वसा अम्ल है, जिसमें अठारह कार्बन परमाणुओं की लंबी शृंखला होती है।




27.2.1 नामपद्धति

अनेक कार्बोक्सिलिक अम्ल लंबे समय से ज्ञात हैं और उनके सामान्य नाम उनके स्रोतों पर आधारित हैं। आईयूपीएसी नामपद्धति में, कार्बोक्सिलिक अम्लों को $-\text{COOH}$ समूह वाली सबसे लंबी कार्बन शृंखला का चयन करके नाम दिए जाते हैं। इसके लिए ऐल्केन के नाम में अंत के $-e$ को ओइक ($-oic$) अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कार्बन शृंखला के संख्यांकन में ($-\text{COOH}$) कार्बन को सदैव 1 संख्या दी जाती है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:



अन्य समूहों और प्रतिस्थापियों को नामपद्धति के सामान्य नियमों के अनुरूप संख्यांकित और नामांकित किया जाता है जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं।

कुछ सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्लों और उनके नामों को नीचे दिया गया है।



दो कार्बोक्सिलिक समूहों वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। उनके नाम लिखने के लिए संगत हाइड्रोकार्बन के नाम में डाइआइक अम्ल अनुलग्न के रूप में जोड़ दिया जाता है। दोनों कार्बोक्सिल कार्बन परमाणुओं को मुख्य शृंखला के भाग के रूप में संख्यांकित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ ऐल्केन के अंत के $-e$ को हटाया नहीं जाता है।



टिप्पणियाँ






मॉड्यूल - 7

कार्बनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल




27.2.2 कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन

कार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण में निम्नलिखित विधियों का सामान्यतया उपयोग किया जाता है। आपने इनमें से कुछ विधियों को पिछले पाठों में पढ़ा है।

1. ऐल्कीनों का उपचयन

गर्म क्षारीय KMnO_4 के साथ उपचयन द्वारा ऐल्कीनों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित किया जा सकता है।




2. ऐल्कोहॉलों और ऐल्डहाइडों का उपचयन

आपने पिछले पाठ में और इस पाठ के पिछले भाग में पढ़ा है कि ऐल्कोहॉलों और ऐल्डहाइडों को कई प्रकार के उपचायकों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपचित किया जा सकता है। आप इन अभिक्रियाओं को एक बार दोहरा सकते हैं।


3. ऐल्कलबेन्जीनों का उपचयन

बेन्जीन वलय से आवंधित प्राथमिक और द्वितीयक ऐल्कल समूहों को क्षारीय KMnO_4 , के उपयोग द्वारा कार्बोक्सिल समूह में उपचित किया जा सकता है।



इस उपचयन के लिए अम्लीकृत सोडियम डाइक्रोमेट का भी उपयोग किया जा सकता है।



कार्बनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ

4. ग्रीन्यार अभिकर्मकों का कार्बोनेटीकरण


ग्रीन्यार अभिकर्मक (RMgX) कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट देते हैं जिनके अम्लीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं।



ध्यान दीजिए कि आरंभिक ऐल्किल हैलाइड की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कार्बन परमाणु अम्ल प्राप्त होते हैं जिनमें आरंभिक ऐल्किल हैलाइड की तुलना में एक कार्बन अधिक होता है।

5. नाइट्राइलों और सायनोहाइड्रिनों का जल-अपघटन

ऐल्किल हैलाइडों को नाइट्राइलों में परिवर्तित किया जा सकता है जिनके अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं जिनमें आरंभिक ऐल्किल हैलाइड की तुलना में एक कार्बन अधिक होता है।




मॉड्यूल - 7

कार्बनिक यौगिकों का रसायन




टिप्पणियाँ

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल




ऐल्डहाइडों से प्राप्त सायनोहाइड्रिनों के जल-अपघटन से भी 2-हाइड्रॉक्सीकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं।




27.2.3 संरचना और भौतिक गुणधर्म

ऐल्डहाइडों और कीटोनों की भाँति कार्बोक्सिल कार्बन परमाणु sp^2 संकरित (sp^2 -hybridised) होता है। अतः इस कार्बन परमाणु से आवंधित तीनों परमाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं और उनके बीच लगभग 120° का आवंध कोण (Bond Angle) होता है जैसा कि चित्र 29.3 में दिखाया गया है।



चित्र. 29.3: कार्बोक्सिल समूह की संरचना

ध्रुवीय कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल समूहों की उपस्थिति के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वितय (dimer) के रूप में उपस्थित होते हैं जिनमें दो कार्बोक्सिलिक अम्ल दो हाइड्रोजन आबंधों द्वारा आपस में बाधित होते हैं। इसे नीचे दिखाया गया है।



अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन वास्तव में कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च गलनांकों और क्वथनांकों के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक और क्वथनांक सारणी 29.2 में दिए गए हैं। आप सारणी में देख सकते हैं कि आरंभिक कुछ सदस्यों की जल में अत्यधिक विलेयता है। यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अणु और विलायक जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंधन की उपस्थिति के कारण है।

सारणी 29.2 : कार्बोक्सिलिक अम्लों के कुछ भौतिक गुणधर्म

कार्बोक्सिलिक	गलनांक (K)	वर्थनांक (K)	जल में विलेयता gmL ⁻¹ पर H ₂ O की 298K	pK _a
HCOOH	281	373.5	∞	3.75
CH ₃ COOH	289.6	391	∞	4.76
CH ₃ CH ₂ COOH	252	414	∞	4.87
CH ₃ CH ₂ CH ₂ COOH	267	437	∞	4.82
CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ COOH	239	460	4.97	4.81
ClCH ₂ COOH	336	462	बहुत अधिक विलेय	2.86
Cl ₂ CHCOOH	283.8	465	बहुत अधिक विलेय	1.48
Cl ₃ CCOOH	329.3	471	बहुत अधिक विलेय	0.70
C ₆ H ₅ COOH	295	523	0.34	4.19
<i>p</i> -CH ₃ C ₆ H ₄ COOH	450	548	0.03	4.36
<i>p</i> -ClC ₆ H ₄ COOH	515		0.009	3.98
<i>p</i> -NO ₂ C ₆ H ₄ COOH	515		0.03	3.41

कार्बनिक यौगिकों का रसायन




टिप्पणियाँ

सारणी के अंतिम कॉलम में दिए गए pK_a मानों के बारे में अभी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगले भाग में जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति की चर्चा करेंगे, तब हम इन मानों पर भी विचार करेंगे।

27.2.4 कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता

कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। वे जल में निम्नलिखित साम्य के अनुसार वियोजित होकर एक प्रोटॉन और कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं।



सारणी 29.2 के अंतिम कॉलम में कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के pK_a मान दिए गए हैं। याद रखिए कि pK_a का मान उच्चतर अम्लता को सूचित करता है। यदि आप इन pK_a मानों की तुलना ऐल्कोहॉलों के pK_a मानों के साथ करें तो आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐल्कोहॉलों की तुलना में कहीं अधिक अम्लीय हैं। इसकी व्याख्या आयनन के परिणामस्वरूप प्राप्त ऋणायनों के आधार पर भी की जा सकती है। कार्बोक्सिलिक

मॉड्यूल - 7


कार्बोनिक यौगिकों का रसायन

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल



टिप्पणियाँ

अम्लों के वियोजन से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन को निम्नलिखित दो संरचनाओं के अनुनाद संकर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।



कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनाद संरचनाएँ

इन संरचनाओं से यह प्रदर्शित होता है कि ऋण आवेश दो ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन स्थायीकृत हो जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन का अधिक स्थायित्व $-\text{COOH}$ समूह से प्रोटॉन के मुक्त होने को सुविधाजनक बनाता है।


यदि आप इस स्थिति की तुलना ऐल्कोहॉल अणु के वियोजन से प्राप्त ऐल्कोक्सॉइड (RO^-) से करें तो आप देखेंगे कि ऐल्कोक्सॉइड में ऐसा कोई अनुनाद द्वारा स्थायित्व संभव नहीं है।

आइए, अब विभिन्न अम्लों की अम्ल प्रबलता का विश्लेषण करें और उन्हें उनकी संरचना के साथ संबंधित करें। यदि आप सारणी 29.2 में दिए गए पहले पाँच कार्बोक्सिलिक अम्लों को देखें तो आप पाएंगे कि उनके pK_a मानों में लगातार वृद्धि हो रही है जिसका अर्थ है कि इस क्रम में अम्ल प्रबलता कम हो रही है। चूंकि ऐल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के होते हैं, वे H^+ के मुक्त होने को कठिन बना देते हैं और इसलिए अम्लका को कम कर देते हैं। अतः एथेनॉइक अम्ल मेथेनॉइक अम्ल से कम अम्लीय होता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन-दाता प्रतिस्थापी (electron-donating substituents) कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को कम कर देते हैं।

आइए अब देखें कि इलेक्ट्रॉन अपनयक प्रतिस्थापियों (electron withdrawing substituents) जैसे कि हैलोजन और नाइट्रो समूह का अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एथेनॉइक अम्ल के pK_a मान (4.76) और क्लोरोएथेनॉइक अम्ल का एथेनॉइक अम्ल का pK_a मान (2.86) की तुलना करने पर यह पता चलता है कि क्लोरोएथेनॉइक अम्ल एथेनॉइक से अधिक प्रबल अम्ल है। क्लोरो प्रतिस्थापी का $-I$ प्रभाव होता है और यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसके कारण H^+ का निकलना आसान हो जाता है।


आप नीचे यह भी देख सकते हैं कि जैसे-जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में हैलोजन समूहों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे-वैसे कार्बोक्सिलिक अम्लता भी बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे H^+ आयन के मुक्त होने को और अधिक सुविधाजनक बनाते जाते हैं।

कार्बनिक यौगिकों का रसायन



अम्लता में वृद्धि

क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव कार्बन शृंखला में समूह की दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है, अतः 2-क्लोरोब्यूटेनॉइक अम्ल (pK_a 2.86) 3- क्लोरोब्यूटेनॉइक अम्ल (pK_a 4.05) से अधिक अम्लीय है जबकि 3- क्लोरोब्यूटेनॉइक अम्ल स्वयं 4-क्लोरोब्यूटेनॉइक अम्ल (pK_a 4.50) की तुलना में अधिक अम्लीय है।



अम्लता में वृद्धि


(या दूसरी ओर घटती है।)

27.2.5 कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएँ


आइए, अब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा की जाने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ें।

1. लवणों का बनना

धातु हाइड्रॉक्साइडों जैसे प्रबल क्षारकों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों की पूर्णतया विप्रोटॉनीकरण (Deprotonisation) हो जाता है और इस प्रकार लवण प्राप्त होते हैं।



यहाँ यह जानना रुचिकर होगा कि साबुन लंबी शृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों जिन्हें वसा अम्ल कहा जाता है, के सोडियम लवण होते हैं।



कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे दुर्बल क्षारकों द्वारा भी विप्रोटॉनीकृत होते हैं। इस अभिक्रिया में वे अम्ल का सोडियम लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं।



टिप्पणियाँ

मॉड्यूल - 7

कार्बनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल




इस अभिक्रिया को प्रयोगशाला में कार्बोक्सिलिक अम्लों के परीक्षण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसी यौगिक की NaHCO_3 के साथ अभिक्रिया द्वारा CO_2 का बुलबुलों के रूप से निकलना यौगिक में कार्बोक्सिल अभिलक्षकीय समूह की उपस्थिति की ओर संकेत करता है।

यह परीक्षण फीनॉलों द्वारा नहीं दिया जाता है क्योंकि वे कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय होते हैं। अतः यौगिकों के इन दो वर्गों में इस परीक्षण के आधार पर अंतर किया जा सकता है।


2. कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन

कार्बोक्सिलिक अम्लों को लीथियम ऐलुमिनियम हाइड्राइड (LiAlH_4) द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉलों में अपचित किया जा सकता है।



3. हेल-फोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया (Hell-Volhard-Zelinski Reaction)

ऐल्डहाइडों और कीटोनों की भाँति कार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड अथवा फॉस्फोरस की उपस्थिति में Br_2 (or Cl_2) के उपयोग द्वारा कार्बन परमाणु पर हैलोजनीकरण होता है।



इस प्रकार प्राप्त α -हैलोअम्ल अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण मध्यवर्ती होते हैं।

4. अम्ल व्युत्पन्नों का संश्लेषण


यह कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों का संश्लेषण कार्बोक्सिलिक अम्लों की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं से होता है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक कार्बन पर पहले नाभिकस्नेही संकलन (nucleophilic addition) होता है और फिर अवशिष्ट समूह



टिप्पणियाँ


के विलोपन के फलस्वरूप एक प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है। यदि आपको ऐल्डहाइडों और कीटोनों की अभिक्रियाएँ याद हों तो उनमें नाभिकस्नेही के संकलन के पश्चात प्रोटॉन के संकलन से एक संकलन उत्पाद प्राप्त होता है।

कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्योंकि ऐसिल कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को नाभिकस्नेही ऐसिल प्रतिस्थापन (nucleophilic acyl substitution) भी कहते हैं।




यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए $\text{X} = \text{OH}$ होता है और Nu^- हैलाइड आयन,

$\text{O}^-\text{C}-\text{R}$, $\text{O}^-\text{R}'$ या NH_2^- समूह हो सकते हैं जिनसे क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइड, ऐनहाइड्राइड एस्टर अथवा ऐमाइड प्रतिस्थापन उत्पादों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न कहा जाता है क्योंकि वे कार्बोक्सिलिक अम्लों से प्राप्त होते हैं।



(i) ऐसिल क्लोराइडों का बनना

कार्बोक्सिलिक अम्ल SOCl_2 , PCl_3 या PCl_5 से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइड बनाते हैं जिन्हें ऐसिल क्लोराइड भी कहा जाता है। इन्हें नीचे दिखाया गया है।





माँड्यूल - 7

कार्बनिक यौगिकों का रसायन





टिप्पणियाँ

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बो्विस्मिलिक अम्ल





(ii) अप्ल ऐनाइहडाइडों का बनना



क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों के ऐनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्लों से जल की हानि से प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से अम्ल के स्थान पर ऐनहाइड्राइड शब्द लिखकर दिए जाते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया में ऐनहाइड्राइड एथेनॉइक अम्ल से बना है, अतः इसे एथेनॉइक ऐनहाइड्राइड कहते हैं।


ऐनहाइड्राइडों को बनाने की इस विधि को समर्पित ऐनहाइड्राइडों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

कार्बोिसिलिक अम्ल पिरिडीन की उपस्थिति में ऐसिल क्लोराइडों से भी अभिक्रिया करके कार्बोिसिलिक अम्ल ऐनहाइड्राइड बनाते हैं।




इस विधि से असमित ऐनहाइड्राइड बनाए जा सकते हैं।

चक्रीय ऐनहाइड्राइडों को डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च ताप पर निर्जलीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।




(iii) एस्टरों का बनना

कार्बोकिसलिक अम्ल ऐल्कोहॉलों के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाते हैं।



ध्यान दीजिए कि अम्ल उत्प्रेरित एस्टरीकरण एक साम्य अभिक्रिया है। यदि हम अभिक्रिया मिश्रण से जल या एस्टर को अलग कर लें तो साम्य को दाँई ओर उत्पादों की तरफ विस्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी एक अभिकर्मक का आधिक्य में प्रयोग करें तो भी साम्य की दाँई ओर एस्टर प्राप्त करने के लिए विस्थापित किया जा सकता है। सामान्यतया ऐल्कोहॉल का आधिक्य में उपयोग किया जाता है और उसका विलायक के रूप में एस्टरीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।



एस्टरों को ऐल्हिकल ऐल्केनोएट जैसे नाम दिए जाते हैं। ऐल्किल भाग ऐल्कोहॉल से तथा ऐल्केनोएट भाग कार्बोकिसलिक अम्ल से आता है। अतः ऊपर दिए गए एस्टर का नाम मेथिल एथेनोएट है क्योंकि यह मेथिल ऐल्कोहॉल तथा एथेनॉइक अम्ल से प्राप्त होता है।

एस्टरों का निर्माण अम्ल क्लोराइडों या अम्ल ऐनहाइड्राइडों को ऐल्कोहॉलों के साथ अभिक्रिया द्वारा भी एस्टरों का निर्माण अम्ल क्लोराइडों या अम्ल ऐनहाइड्राइडों को ऐल्कोहॉलों के साथ अभिक्रिया द्वारा भी संभव है। अतः हम देख सकते हैं कि अम्ल व्युत्पन्नों को एक-दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है।



मॉड्यूल - 7

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल

कार्बनिक यौगिकों का रसायन




टिप्पणियाँ




(iv) ऐमाइडों का बनना



कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया अथवा ऐमीनों से अभिक्रिया द्वारा ऐमाइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अमोनियम कार्बोक्सिलेट लवण मध्यवर्ती बनता है जो गर्म करने पर ऐमाइड बनाता है।



ऐमाइडों को कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइडों, ऐनहाइड्राइडों और एस्टरों की अमोनिया या ऐमीनों के साथ अभिक्रिया द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।



कार्बनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ


अतः हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न से दूसरे को बना सकते हैं। साधारणतया कम अभिक्रियाशील अम्ल व्युत्पन्नों को अधिक अभिक्रियाशील व्युत्पन्नों से बनाया जा सकता है।

विभिन्न अम्ल व्युत्पन्नों की अभिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है:

अम्ल क्लोराइड > अम्ल ऐनहाइड्राइड > एस्टर > ऐमाइड

अतः अम्ल क्लोराइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील तथा ऐमाइड सबसे कम अभिक्रियाशील हैं।

क्योंकि कम अभिक्रियाशील व्युत्पन्नों को अधिक अभिक्रियाशील व्युत्पन्नों से प्राप्त किया जा सकता है। हम निम्नलिखित प्रकार से संक्षेप में लिख सकते हैं कि कौन से व्युत्पन्न को किस व्युत्पन्न से प्राप्त किया जा सकता है।



इन व्यत्पन्नों को कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी बनाया जा सकता है।



पाठगत प्रश्न 27-2

1. कॉलम I में दिए निम्नलिखित यौगिकों को कॉलम II में दिए गए उनके वर्णों के साथ सही-सही मिलाइए:

मॉड्यूल - 7

कार्बनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल


कॉलम I

- (i) CH_3COOH
- (ii) CH_3CONH_2
- (iii) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$
- (iv) CH_3COCl
- (v) $\text{CH}_3\text{COOCOCH}_2\text{Cl}$

कॉलम II

- (a) कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइड
- (b) कार्बोक्सिलिक अम्ल
- (c) कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐनहाइड्राइड
- (d) कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐमाइड
- (e) एस्टर



2. निम्नलिखित अम्लों को उनकी जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए:



3. निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय होगा और क्यों?

ब्यूटेनॉइक अम्ल, 2-क्लोरोब्यूटेनॉइक अम्ल, 3-क्लोरोब्यूटेनॉइक अम्ल, 4-क्लोरोब्यूटेनॉइक अम्ल

4. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद दीजिए:



5. कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐल्कोहॉलों से अधिक अम्लीय क्यों होते हैं?



आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि


- ऐल्डहाइडों और कीटोनों को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ऐल्डहाइडों को ऐल्केनेल और कीटोनों को ऐल्केनोन कहा जाता है।
- ऐल्डहाइडों और कीटोनों को ऐल्कोहॉलों के उपचयन (Oxidation), ऐल्कीनों के ओजोन अपघटन (Ozonolysis), ऐल्काइनों के जलयोजन (Hydration) और फ्रीडेल-क्रॉफ्ट्स ऐसिलीकरण (Friedel-Crafts Acylation) द्वारा बनाया जा सकता है।
- कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है और कार्बोनिल कार्बन पर नाभिकस्नेही

कार्बोनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ

- चूंकि α -हाइड्रोजन प्रकृति में अम्लीय होता है, अतः ऐल्डहाइड और कीटोनों पर अनेक अभिकर्मकों द्वारा नाभिकस्नेही संकलन अभिक्रियाएँ होती हैं। वे संघनन अभिक्रियाएँ भी प्रदर्शित करते हैं।
- कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिकों का महत्वपूर्ण वर्ग है।
- कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने के लिए ऐल्कीनों, ऐल्डहाइडों और कीटोनों तथा ऐल्किलबेन्जीनों का उपचयन, नाइट्राइलों का जल-अपघटन और ग्रीन्यार अभिकर्मकों के कार्बोनेटीकरण आदि विधियों का उपयोग किया जाता है।
- कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु हाइड्रोजन आबंधन प्रदर्शित करते हैं और द्वितयों के रूप में पाए जाते हैं।
- कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उनकी अम्लता को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह वाली कार्बन शृंखला पर उपस्थिति प्रतिस्थापियों की प्रकृति भी एक है।
- कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल क्षारकों जैसे धातु हाइड्रॉक्साइडों के साथ लवण बनाते हैं। वे α -कार्बन परमाणु पर हैलोजनीकरण करते हैं और उन्हें LiAlH_4 के उपयोग द्वारा प्राथमिक ऐल्कोहॉल में अपचित किया जा सकता है।
- कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाभिकस्नेही ऐसिल प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा अनेक कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलाइड, ऐनहाइड्राइड, एस्टर और ऐमाइड बनाए जा सकते हैं।



पाठांत्र प्रश्न

- $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$. अणु सूत्र एक और कार्बोनिल अभिलक्षकीय समूह वाले सभी यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र और आई.यू.पी.ए.सी. नाम लिखिए।
- ऐल्हाइडों और कीटोनों से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐल्कोहॉल किस प्रकार बनाएंगे?

मॉड्यूल - 7

कार्बनिक यौगिकों का रसायन



टिप्पणियाँ

ऐल्डहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल


3. टॉलेन परीक्षण क्या है?
4. कीटो-ईनॉल चलावयवता की व्याख्या कीजिए।
5. हैलोफार्म अभिक्रिया क्या होती है?
6. आप प्रयोगशाला में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण किस प्रकार करेंगे?
7. किस अभिकर्मक द्वारा किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राथमिक ऐल्कोहॉल में अपचित किया जा सकता है?
8. कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐनहाइड्राइड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों से उन्हें बनाने की विधियाँ दीजिए।
9. कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न सबसे अधिक अभिक्रियाशील है?
 - (a) अम्ल ऐमाइड (b) एस्टर (c) अम्ल हैलाइड (d) अम्ल ऐनहाइड्राइड




पाठ्यगत प्रश्नों के उत्तर

27.1

1. (i) ऐल्डहाइड एथेनैल
 (ii) कीटोन, ब्यूटेन-2-ऑन
 (iii) कीटोन, 1-फेनिलएथेनैन
 (iv) ऐल्डहाइड, प्रोपेनैल
2. Hg^{2+} , H^+ के साथ जलयोजन द्वारा
3. क्योंकि ऐल्डहाइडों में एक ऐल्किल समूह होता है जबकि कीटोनों में दो ऐल्किल समूह होते हैं। अतः ऐल्डहाइडों में कार्बोनिल कार्बन अधिक धनात्मक होता है। कीटोनों में दो ऐल्किल समूह अधिक पास होने के कारण भी बाधा उत्पन्न करते हैं।



5. बुल्फ-किशनर अपचयन अथवा क्लीमेन्सन
6. अपचयन द्वारा दो ऐल्डहाइड अणुओं के संघनन से प्राप्त उत्पाद। ऐल्डॉल में ऐल्डहाइड और ऐल्कोहॉल दोनों अभिलक्षकीय समूह उपस्थित होते हैं।




27.2

1. (i). (b) (ii). (d) (iii). (e) (iv). (a) (v) e
2. $p - \text{ClC}_6\text{H}_4\text{COOH} < \text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH} < \text{CH}_3\text{COOH}$
3. 2-क्लोरोब्यूटेनॉइक अम्ल क्योंकि 2-स्थिति पर $-\text{Cl}$ का सबसे अधिक प्रभाव – I होता है।



टिप्पणियाँ



- (iii) $3\text{CH}_3\text{COCl} + \text{H}_3\text{PO}_3$
5. कार्बोक्सिलेट ऋणायन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण। ऐल्कॉक्साइड आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण नहीं हो सकता है।